

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
الموضوع الأول		
التمرين الأول: (04 نقاط)		
01	0.25 0.50 0.25	(1) بيان أن المستقيمين متقاطعان $(\Delta'): \begin{cases} x = -t' + 1 \\ y = 2t' - 3 \\ z = t' - 4 \end{cases} / t' \in \mathbb{R}$ $(\Delta) \cap (\Delta') = \{A(-1; 1; -2)\} \quad \begin{cases} t = 1 \\ t' = 2 \end{cases} \quad \text{معناه} \quad \begin{cases} t - 2 = -t' + 1 \\ -t + 2 = 2t' - 3 \\ 2t - 4 = t' - 4 \end{cases}$
1.25	0.50 0.75	(2) التمثيل الوسيط للمستوي هو : $(P): \begin{cases} x = \alpha - \beta - 1 \\ y = -\alpha + 2\beta + 1 \\ z = 2\alpha + \beta - 2 \end{cases} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ استنتاج المعادلة الديكارتية $(P): 5x + 3y - z = 0$
01	01	(3) بيان أن (S) سطح كرة مركزها منتصف القطعة $[AB]$ ونصف قطرها 2. طريقة (1): $AM^2 + BM^2 = 20$ تكافئ $IM^2 = 10 - AI^2$ حيث I منتصف القطعة $[AB]$ تكافئ $IM = 2$ طريقة (2): $AM^2 + BM^2 = 20$ تكافئ $x^2 + (y+1)^2 + (z+3)^2 = 4$
0.75	0.50 0.25	(4) الوضع النسبي للمستوي (P) و سطح الكرة (S) . $d(I; (P)) = 0$ ومنه (P) يقطع (S) في دائرة مركزها I ونصف قطرها 2
التمرين الثاني: (04 نقاط)		
1.25	0.25 0.25 0.25 0.50	(1) أ) $\text{pgcd}(20; 104) = 4$ بما أن $\text{pgcd}(20; 104)$ قاسم للعدد 272 فإن المعادلة (E) تقبل حلول ب) بيان أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ حلا للمعادلة (E) فإن $x \equiv 3[5]$ (E) تكافئ $26x - 5y = 68$ ومنه $26x \equiv 68[5]$ ومنه $x \equiv 3[5]$ مجموعة حلول المعادلة (E) هي : $S = \{(5k+3; 26k+2) / k \in \mathbb{Z}\}$
1.50	0.50 0.25	(2) تعيين α و β $\begin{cases} 104\alpha - 20\beta = 272 \\ 0 \leq \alpha \leq 3; 0 \leq \beta \leq 3 \end{cases} \quad \text{تكافئ} \quad \overline{1\alpha\alpha\beta 01} = \overline{1\alpha\beta 01}$

الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة : الرياضيات / الشعبة : رياضيات/البكالوريا دورة: 2017

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
	0.50	$\begin{cases} \alpha = 5k+3 \\ \beta = 26k+2 \\ 0 \leq \alpha \leq 3; 0 \leq \beta \leq 3 \end{cases} \quad / k \in \mathbb{N} \quad \text{معناه}$
	0.25	
	2×0.25	(3) التحقق أنَّ كلا من 2017 و 1009 عدد أولي تعيين الثنائيات $(a ; b)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق: $2m - d = 2017$
1.25	0.25	$\begin{cases} a'b' = \frac{2017}{d} + 1 \\ a = a'd; b = b'd \\ p \gcd(a', b') = 1 \end{cases} \quad 2m - d = 2017 \text{ تكافئ}$
	2×0.25	ومنه : $(a ; b) \in \{(1;1009), (1009;1)\}$
التمرين الثالث: (05 نقاط)		
01	0.25	(1) حل المعادلة : $\Delta = -24 = (2i\sqrt{6})^2$ $S = \{2 - 2i; \sqrt{2} + i\sqrt{6}; \sqrt{2} - i\sqrt{6}\}$
	3×0.25	
	3×0.25	(2) أ) $z_C = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$ و $z_B = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{3}}$ ، $z_A = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{3}}$ بما أن $OA = OB = OC = 2\sqrt{2}$ فإن النقط A ، B و C تنتمي إلى الدائرة (Ω) التي مركزها O و نصف قطرها $2\sqrt{2}$.
	0.25	ب) $\left(\frac{z_A}{z_C}\right)^n = e^{i\frac{7\pi}{12}n}$ تخيلي صرف
	0.50	معناه $\frac{7\pi n}{12} = \frac{\pi}{2} + k\pi$ / $h \in \mathbb{N}$ معناه $n = 12h + 6$
3.25	0.25	ج) التحقق أن C نقطة من (Γ) من أجل $z \neq z_C$: $z = z_C - k\left(\frac{z_A}{z_B}\right)$ تكافئ $\arg(z - z_C) = \pi + \arg\left(\frac{z_A}{z_B}\right)$
	0.50	تكافئ $(\vec{u}; \overrightarrow{CM}) = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$
	0.25	

العلامة		عناصر الإجابة																		
المجموع	مجزأة																			
	0.25	و منه (Γ) مجموعة نقط نصف المستقيم الذي حده C و يصنع مع حامل محور الفواصل زاوية $-\frac{\pi}{3}$. انشاء (Γ).																		
0.75	0.50	(3) تعيين طبيعة التحويل $h \circ r$ هو تشابه مباشر مركزه O و نسبته 2 زاويته $-\frac{\pi}{3}$																		
	0.25	صورة الدائرة (Ω) بالتحويل $h \circ r$ هي الدائرة (Ω') التي مركزها O و نصف قطرها $4\sqrt{2}$.																		
التمرين الرابع: (07 نقاط)																				
2.25	0.25	(1) أ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$																		
	0.25	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$																		
	0.25	$y=0$ معادلة المقارب للمنحني (C_f).																		
	0.50	ب) بيان أن : من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = x(x^2 - 5x + 4)e^{-x+1}$ ، إشارة $f'(x)$																		
	0.25	<table border="1"><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr></table>	x	$-\infty$	0	1	4	$+\infty$	$f'(x)$	-	0	+	0	-						
x	$-\infty$	0	1	4	$+\infty$															
$f'(x)$	-	0	+	0	-															
	0.25	اتجاه تغير الدالة f f متزايدة تماما على $[0;1]$ و $[4;+\infty[$ f متناقصة تماما على $[1;4]$ و $]-\infty;0]$																		
	0.50	جدول التغيرات <table border="1"><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$+\infty$</td><td>0</td><td>1</td><td>$-32e^{-3}$</td><td>0</td></tr></table>	x	$-\infty$	0	1	4	$+\infty$	$f'(x)$	-	0	+	0	-	$f(x)$	$+\infty$	0	1	$-32e^{-3}$	0
x	$-\infty$	0	1	4	$+\infty$															
$f'(x)$	-	0	+	0	-															
$f(x)$	$+\infty$	0	1	$-32e^{-3}$	0															
0.50	0.50	(2) معادلة المماس (T) $y = -4e^{-1}(x - 2)$																		

العلامة		عناصر الإجابة											
المجموع	مجزأة												
1.50	0.25	(3) دراسة اتجاه تغير الدالة h											
	0.25	$h'(x) = x(2-x)e^{-x+2}$											
		h متزايدة تماما على $[0;2]$											
		h متناقصة تماما $[2;+\infty[$											
		استنتاج إشارة $h(x)$:											
		<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$h'(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>$h(x)$</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></table>	x	0	2	$+\infty$	$h'(x)$	+	0	-	$h(x)$		0
x	0	2	$+\infty$										
$h'(x)$	+	0	-										
$h(x)$		0											
0.25		من أجل كل $x \in [0;+\infty[$ فإن $h(x) \leq 0$											
0.25		تحديد وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (T)											
0.25		إشارة $f(x) - (-4e^{-1}(x-2)) = (2-x) \times e^{-1} \times h(x)$ من إشارة $(2-x)h(x)$											
0.25		<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$(2-x)h(x)$</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table>	x	0	2	$+\infty$	$(2-x)h(x)$	0	-	0	+		
x	0	2	$+\infty$										
$(2-x)h(x)$	0	-	0	+									
0.25		(C_f) فوق (T) على المجال $]2;+\infty[$											
0.25		(C_f) تحت (T) على المجال $]0;2[$											
01	0.25	(4) ارسم المماس (T)											
	0.75	والمنحنى (C_f) على المجال $]0;+\infty[$.											
0.75	0.75	(5) المناقشة بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة (E) .											
		إذا كان $m = -4e^{-1}$ أو $m > 0$ فإن المعادلة لها حلا وحيد											
		إذا كان $-4e^{-1} < m < 0$ فإن للمعادلة ثلاثة حلول											
		إذا كان $m = 0$ فإن للمعادلة حلين											
	0.25	(6) جدول تغيّرات الدالة g .											
	0.25	الدالة g هي مركب الدالة مقلوب و الدالة f بهذا الترتيب											

العلامة		عناصر الإجابة																
المجموع	مجزأة																	
01	0.25	(يمكن استعمال مشتقة مركب دالتين) $(g'(x) = \frac{-4x^2 + 5x - 1}{x^3} e^{1-\frac{1}{x}})$ النهايات : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ إشارة $g'(x)$																
	0.25	<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>$\frac{1}{4}$</td><td>$1 + \infty$</td></tr><tr><td>$g'(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr></table>	x	0	$\frac{1}{4}$	$1 + \infty$	$g'(x)$	-	0	+	0	-						
	x	0	$\frac{1}{4}$	$1 + \infty$														
$g'(x)$	-	0	+	0	-													
0.25	<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>$\frac{1}{4}$</td><td>1</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$g'(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>$g(x)$</td><td>0</td><td></td><td></td><td>1</td><td>0</td></tr></table> $(-32)e^{-3}$	x	0	$\frac{1}{4}$	1	$+\infty$	$g'(x)$	-	0	+	0	-	$g(x)$	0			1	0
x	0	$\frac{1}{4}$	1	$+\infty$														
$g'(x)$	-	0	+	0	-													
$g(x)$	0			1	0													

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	الموضوع الثاني
التمرين الأول: (04 نقاط)		
0.75	0.75	(1) برهان بالتراجع أن: من أجل كل عدد طبيعي n ، $3u_n = 7^{n+1} - 4$.
1.25	0.25	(أ) حساب بدلالة n المجموع : $S_n = \frac{7^{n+1} - 1}{6}$
	0.50	إيجاد علاقة بين S_n و S'_n : $3S'_n = 7S_n - 4(n+1)$
	0.50	(ب) استنتاج أن: من أجل كل عدد طبيعي n ، $18 \times S'_n = 7^{n+2} - 24n - 31$.
01	4×0.25	(2) (أ) دراسة حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي قسمة العدد 7^n على 5. $7^{4k} \equiv 1[5]$; $7^{4k+1} \equiv 2[5]$; $7^{4k+2} \equiv 4[5]$; $7^{4k+3} \equiv 3[5]$ / $k \in \mathbb{N}$
01	4×0.25	(ب) تعيين قيم n $n \in \{20h+12 ; 20h+13 ; 20h+10 ; 20h+19 / h \in \mathbb{N}\}$ معناه $S'_n \equiv 0[5]$
التمرين الثاني: (04 نقاط)		
0.75	0.75	(1) تعيين معادلة ديكارتية للمستوي (P) : $y - z + 2 = 0$
2.25	0.50	(2) (أ) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x \cos \alpha - 2y \sin \alpha - z - \frac{3}{4} = 0$ تكافئ
	0.50	$(x - \cos \alpha)^2 + (y - \sin \alpha)^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = 2$
	0.50	(E_α) هي سطح كرة مركزها $(\cos \alpha ; \sin \alpha ; \frac{1}{2})$ ونصف قطرها $\sqrt{2}$
	0.50	(ب) الوضع النسبي للمستوي (P) و سطح الكرة (E_α) .
	0.50	$d((p); \omega_\alpha) = \frac{\frac{3}{2} + \sin \alpha}{\sqrt{2}}$
0.25	0.25	إذا كان $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{6}\right]$ فإن (P) يقطع (E_α) في دائرة
	0.25	إذا كان $\alpha = \frac{\pi}{6}$ فإن (P) يمس (E_α)
	0.25	إذا كان $\alpha \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}\right]$ فإن $(P) \cap (E_\alpha) = \{ \}$
01	0.50	(3) التمثيل الوسيط للمستقيم (D) / $t \in \mathbb{R}$ $\begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ y = t + \frac{1}{2} \\ z = -t + \frac{1}{2} \end{cases}$

الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة : الرياضيات / الشعبة : رياضيات/البكالوريا دورة: 2017

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
	0.50	استنتاج إحداثيات $I(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; \frac{3}{2})$
التمرين الثالث: (05 نقاط)		
0.75	0.25 2×0.25	$\left(\frac{5}{2} + i\right)^2 = \frac{21}{4} + 5i \quad (I)$ الجزرين التربيعيين للعدد المركب : $\frac{21}{4} + 5i$ هما $\frac{5}{2} + i$; $-\frac{5}{2} - i$
0.75	0.50 0.25	$z_A = \frac{5}{2} + i \quad (1)$ $z_C = -\frac{5}{2} + i$
01	0.50 0.50	$\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = e^{i\frac{\pi}{2}} \quad (2)$ المثلث ABC قائم في B ومتقايس الساقين
2.50	0.75	$z' = \frac{1}{2}(1+i)z - \frac{3}{4} - \frac{3}{4}i \quad (3)$ أ) العبارة المركبة للتشابه المباشر :
	0.50	نسبة التشابه S هي $\frac{\sqrt{2}}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{4}$
	0.25	$T_n = S \circ S \circ S \circ \dots \circ S = S \left(B; \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n; \frac{n\pi}{4} \right) \quad (ب)$
	0.50	$n=4k \quad / k \in \mathbb{N}$ T_n تحاك معناه العناصر المميزة. مركز التحاكي هو B ونسبته معرفة كما يلي :
	2×0.25	إذا كان k زوجيا فان نسبته هي $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$ ، إذا كان k فرديا فان نسبته هي $-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$
التمرين الرابع: (07 نقاط)		
0.50	0.25 0.25	(I) 1) دراسة اتجاه تغير الدالة g. $g'(x) = -\frac{x+1}{x^2}$ g متناقصة تماما على $]0; +\infty[$
	0.50	(2) بيان أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]1,76; 1,77[$

العلامة		عناصر الإجابة												
المجموع	مجزأة													
01	0.50	استنتج إشارة $g(x)$ <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>$\alpha + \infty$</td></tr><tr><td>$g(x)$</td><td>+</td><td>-</td></tr></table>	x	0	$\alpha + \infty$	$g(x)$	+	-						
x	0	$\alpha + \infty$												
$g(x)$	+	-												
0.75	0.25 0.25 0.25	(1) اثبات أن الدالة f مستمرة عند العدد 0 على اليمين $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ التفسير البياني (C_f) يقبل نصف مماس يوازي حامل محور الترتيب												
0.50	0.50	(2) اثبات أن: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$ ، $f'(x) = \frac{g(x)}{(x - \ln x)^2}$.												
01	0.25 0.25 0.50	(3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ التفسير البياني: (C_f) يقبل مستقيما مقاربا معادلته $y = 1$ جدول تغيرات الدالة f . <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>α</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>0</td><td>$f(\alpha)$</td><td>1</td></tr></table>	x	0	α	$+\infty$	$f'(x)$	+	0	-	$f(x)$	0	$f(\alpha)$	1
x	0	α	$+\infty$											
$f'(x)$	+	0	-											
$f(x)$	0	$f(\alpha)$	1											
2.25	0.25 0.25 0.50	(4) $h'(x) = \frac{x-1}{x}$ من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما ، لدينا $h(x) \geq h(1)$ ومنه $h(x) > 0$ الوضع النسبي: $f(x) - 1 = \frac{1 + \ln x}{x - \ln x}$ <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>$\frac{1}{e}$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x) - 1$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table> (C_f) تحت (Δ) من اجل $x \in]0; \frac{1}{e}[$ ، (C_f) فوق (Δ) من اجل $x \in \left[\frac{1}{e}; +\infty\right[$ ، $(C_f) \cap (\Delta) = \left\{ A\left(\frac{1}{e}; 1\right) \right\}$ ،	x	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$	$f(x) - 1$	-	0	+				
x	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$											
$f(x) - 1$	-	0	+											

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
	01	(ب) الرسم
	0.25	(5) اثبات أن: من أجل كل عدد حقيقي $x \geq 1$ ، $\frac{1}{x} + 1 \leq f(x) \leq f(\alpha)$ ، من جدول تغيرات الدالة f نجد (1)..... $f(x) \leq f(\alpha)$ ، إشارة: $f(x) - (\frac{1}{x} + 1) = \frac{(x+1)\ln x}{x - \ln x}$
01	0.25	من أجل $x \geq 1$ ، (2)..... $f(x) - (\frac{1}{x} + 1) \geq 0$ من (1) و (2) نجد: $\frac{1}{x} + 1 \leq f(x) \leq f(\alpha)$
	0.25	- بما أن $F(e) = \int_1^e f(t) dt$ فان $F(e)$ هو مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_f) وحامل
	0.25	محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتيهما $x=1$; $x=e$ - حصر $F(e)$ هو : $e \leq F(e) \leq f(\alpha)(e-1)$