

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)										
العلامة	مجزأة											
التمرين الأول (04 نقاط)												
1	0,5×2	(ب) ، $u_n = u_0 + nr = 5n + 3$ (1)										
1	0,5×2	(أ) ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1} \right) = -1$ لأن $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ (2)										
1	0,5×2	(أ) ، $e^{-x} - e^2 \geq 0$ تكافئ $x \leq -2$ (3)										
1	0,5×2	(ج) ، $f'(x) = -xe^x$ (4)										
التمرين الثاني (04 نقاط)												
0,75	0,25×3	للمعادلة $x^2 + x - 6 = 0$ حلان: 2 و -3 (1)										
2,25	0,25 + 0,5	(أ) $q^2 + q - 6 = 0$ و $q > 0$ ومنه: $q = 2$ (2)										
	0,5	$u_n = 3 \times 2^n$										
	0,5	(ب) (u_n) متزايدة تماما.										
1	0,5	(ج) $u_n = 768$ يعني $n = 8$										
	0,5	$S_n = 3(2^{n+1} - 1)$ (3)										
التمرين الثالث (04 نقاط)												
1,5	0,5	(أ) $f'(x) = \frac{4x + a}{2x^2 + ax + b}$ (1)										
	0,5×2	(ب) $a = 2$ و $b = 1$										
1,5	0,25×2	(أ) للمعادلة $f(x) = 0$ حلان هما: -1 و 0 (2)										
	0,5	(ب) إشارة $f'(x)$ <table><tr><td>x</td><td>-∞</td><td>-1/2</td><td>+∞</td></tr><tr><td>f'(x)</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table>	x	-∞	-1/2	+∞	f'(x)	-	0	+		
	x	-∞	-1/2	+∞								
f'(x)	-	0	+									
0,5	(ب) إشارة $f(x)$ <table><tr><td>x</td><td>-∞</td><td>-1</td><td>0</td><td>+∞</td></tr><tr><td>f(x)</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table>	x	-∞	-1	0	+∞	f(x)	+	0	-	0	+
x	-∞	-1	0	+∞								
f(x)	+	0	-	0	+							
1	0,5	من أجل كل x من $]0; +\infty[$ ، $g'(x) = -\frac{f'(x)}{(f(x))^2}$ (3)										
	0,25	g متناقصة تماما على $]0; +\infty[$										
	0,25	جدول التغيرات: <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>+∞</td></tr><tr><td>g'(x)</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>g(x)</td><td>+∞</td><td>0</td></tr></table>	x	0	+∞	g'(x)	-		g(x)	+∞	0	
x	0	+∞										
g'(x)	-											
g(x)	+∞	0										

التمرين الرابع (08 نقاط)																								
1,5	0,5	أ) من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{3\}$ ، $f(x) = x - 2 + \frac{1}{x-3}$	(1)																					
	$0,25 \times 4$	ب) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$																						
1	$0,25 \times 2$	أ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (x-2)) = 0$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x-2)) = 0$	(2)																					
	$0,25 \times 2$	ب) (C_f) أسفل (Δ) على $]-\infty; 3[$ و (C_f) أعلى (Δ) على $]3; +\infty[$																						
2,25	0,75	أ) من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{3\}$ ، $f'(x) = \frac{(x-2)(x-4)}{(x-3)^2}$	(3)																					
	0,5	ب) إشارة $f'(x)$																						
	0,5	f متزايدة تماما على كل من $]-\infty; 2]$ و $[4; +\infty[$																						
	0,5	ومتناقصة تماما على كل من $[2; 3[$ و $]3; 4]$																						
		جدول التغيرات:																						
		<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$-\infty$</td><td>$\nearrow$</td><td>-1</td><td>$\searrow$</td><td>3</td><td>$\nearrow$</td><td>$+\infty$</td></tr></table>	x	$-\infty$	2	3	4	$+\infty$	$f'(x)$	+	0	-	-	0	+	$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-1	$\searrow$	3	$\nearrow$	$+\infty$	
x	$-\infty$	2	3	4	$+\infty$																			
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+																		
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-1	$\searrow$	3	$\nearrow$	$+\infty$																	
2	0,75	أ) من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{3\}$ ، $f(3-x) + f(3+x) = 2$ ، النقطة $A(3;1)$ مركز تناظر للمنحني (C_f)	(4)																					
	0,25	ب) رسم (Δ)																						
	0,5	رسم (C_f)																						
	0,5	رسم (C_g)																						
0,75	0,75	$\mathcal{A} = \int_4^5 \frac{1}{x-3} dx = (\ln 2) u.a$	(5)																					
0,5	0,5	$g(x) = f(x)$ من أجل $x > 3$ و $g(x) = -f(x)$ من أجل $x < 3$	(6)																					
		(C_g) و (C_f) منطبقان من أجل $x > 3$ (C_g) و (C_f) متناظران بالنسبة إلى محور الترتيب من أجل $x < 3$																						

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)														
العلامة	مجزأة															
التمرين الأول (04 نقاط)																
1	0,5×2	(ب) $u_0=1$ ، $r=2$ (1)														
1	0,5×2	(ج) $\{e ; e^2\}$ (2)														
1	0,5×2	(ب) 1 ، $\frac{1}{3} \int_{-2}^1 h(x) dx=1$ (3)														
1	0,5×2	(أ) $x_0=1$ ، $k'(x)=-1$ معناه $x=1$ (4)														
التمرين الثاني (04 نقاط)																
1,25	0,25×3	(أ) $u_1=8$ ، $u_2=23$ و $u_3=68$ (1)														
	0,25×2	(ب) الدالة $x \mapsto 3x-1$ متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ (u_n) متزايدة تماما لأنّ: $u_1-u_0>0$ والدالة المرفقة متزايدة تماما.														
1,75	0,25+0,5	(أ) (v_n) متتالية هندسية أساسها 3 ، $v_0=\frac{5}{2}$ (2)														
	0,5×2	(ب) $v_n=\frac{5}{2} \times 3^n$ ، $u_n=\frac{5}{2} \times 3^n + \frac{1}{2}$														
1	0,5	(أ) $S_n=\frac{5}{4} \left(3^{n+1}-1\right)$ (3)														
	0,25	$T_n=S_n+\frac{1}{2}(n+1)=\frac{5}{4} \times 3^{n+1}+\frac{1}{2}n-\frac{3}{4}$														
	0,25	(ب) $4T_n-2n=1212$ من أجل $n=4$														
التمرين الثالث (04 نقاط)																
2,25	0,5	(أ) إشارة $f'(x)$														
	0,25×2	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td>+</td><td> </td><td>- 0 +</td><td></td></tr></table> f متزايدة تماما على كل من $]-\infty;0[$ و $[2 ; +\infty[$ ومتناقصة تماما على $]0;2]$	x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	$f'(x)$	+		- 0 +					
	x	$-\infty$	0	2	$+\infty$											
	$f'(x)$	+		- 0 +												
0,25	(ب) $y=x$ (Δ)															
0,25×2	(ج) للمعادلة $f(x)=3$ حلّان هما -1 و 2															
0,5		(د) جدول التغيرات:														
		<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td></td><td>+</td><td> </td><td>- 0 +</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$-\infty$</td><td>$\nearrow +\infty$</td><td>$\searrow 3 \nearrow +\infty$</td><td></td></tr></table>	x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	$f'(x)$		+		- 0 +	$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow +\infty$	$\searrow 3 \nearrow +\infty$
x	$-\infty$	0	2	$+\infty$												
$f'(x)$		+		- 0 +												
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow +\infty$	$\searrow 3 \nearrow +\infty$													

1	0,25 × 3	(أ) f مستمرة و متزايدة تماما على $[-1,6 ; -1,5]$ $f(-1,5) \approx 0,28$ و $f(-1,6) \approx -0,04$ للمعادلة $f(x) = 0$ حلّ وحيد α في المجال $]-1,6 ; -1,5[$	(2)										
	0,25	(ب) إشارة $f(x)$ <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>α</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>+</td></tr></table>		x	$-\infty$	α	0	$+\infty$	$f(x)$	-	0	+	+
x	$-\infty$	α	0	$+\infty$									
$f(x)$	-	0	+	+									
0,75	0,25	من أجل كلّ x من $]0 ; +\infty[$ ، $g'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$	(3)										
	0,5	جدول التغيّرات: <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$g'(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr><tr><td>$g(x)$</td><td>$+\infty$</td><td>$\ln 3$</td><td>$+\infty$</td></tr></table>		x	0	2	$+\infty$	$g'(x)$	-	0	+	$g(x)$	$+\infty$
x	0	2	$+\infty$										
$g'(x)$	-	0	+										
$g(x)$	$+\infty$	$\ln 3$	$+\infty$										
التمرين الرابع (08 نقاط)													
1	0,5 × 2	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$	(1)										
2,5	0,5 × 2	(أ) من أجل كلّ x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x) = 2(x+1)(e^x + 1)$	(2)										
	0,5 0,25 × 2	(ب) إشارة $f'(x)$ f متناقصة تماما على $]-\infty ; -1[$ و متزايدة تماما على $[-1 ; +\infty[$											
	0,5	جدول التغيّرات: <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>-1</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$+\infty$</td><td>$-1 - \frac{2}{e}$</td><td>$+\infty$</td></tr></table>		x	$-\infty$	-1	$+\infty$	$f'(x)$	-	0	+	$f(x)$	$+\infty$
x	$-\infty$	-1	$+\infty$										
$f'(x)$	-	0	+										
$f(x)$	$+\infty$	$-1 - \frac{2}{e}$	$+\infty$										
0,75	0,75	$(T): y = 4x$	(3)										
1	0,25 × 4	$f(x) - x^2 = 2x(1 + e^x)$ ، ومنه: (c_f) و (c_g) يتقاطعان في O (c_f) أسفل (c_g) على $]0 ; +\infty[$ و (c_f) أعلى (c_g) على $]-\infty ; 0[$	(4)										
1,75	0,25 × 3	$f(1) = 3 + 2e$ ، $f(-2) = -4e^{-2}$ ، $f(-3) = 3 - 6e^{-3}$	(5)										
	0,25	رسم (T)											
	0,25 0,5	رسم (c_g) رسم (c_f)											
1	0,5 0,5	(أ) من أجل كلّ x من $\mathbb{R}$ ، $H'(x) = h(x)$ (ب) $\mathcal{A} = \int_0^1 (2x + 2xe^x) dx = [x^2 + 2(x-1)e^x]_0^1 = 3 \text{ u.a}$	(6)										

ملاحظة: تُقبل جميع طرائق الحلّ الصحيحة مع التقيد بسلم التنقيط.