










العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
00,75		التمرين الأول: (07 نقاط)
		1-I أ- إيجاد الصيغة الجزيئية للمركب (A):
	0,25	$\frac{M_{(A)}}{100\%} = \frac{1 \times 16}{O\%} \Rightarrow M_{(A)} = \frac{16 \times 100}{13,33} = 120 \text{ g.mol}^{-1}$
00,75	0,25	A: $C_n H_{2n-8} O \Rightarrow 14n - 8 + 16 = 120 \Rightarrow n = 8$
	0,25	A: $C_8 H_8 O$
		ب- كتابة الصيغة نصف المفصلة للمركب (A):
03,50	0,25	(A): 
		2 أ- الصيغ نصف المفصلة للمركبات: B , C , D , E , F .
	0,5×5	(B):  (C):  (D): 
03,50		(E):  (F): $HOOC-(CH_2)_4-COOH$
	0,25	ب- نوع البلمرة في التفاعل 5: بلمرة بالتكاثف
	0,25	ج- حساب درجة بلمرة البوليمير (P):
03,50	0,25	$n = \frac{M_{\text{Polymère}}}{M_{\text{motif}}}$
	0,25	$M_{\text{motif}} = 14M_C + 16M_H + 4M_O = 14 \times 12 + 16 \times 1 + 4 \times 16 = 248 \text{ g.mol}^{-1}$
	0,25	$n = \frac{502200}{248} = 2025$
01,00		II - 1 أ- الصيغ نصف المفصلة للمركبات G , H , I وحمض البنزويك (X):
	0,25×4	(G):  (H):  (I):  (X): 
		2 أ- موازنة المعادلتين النصفيتين:
01,75	0,125	$MnO_4^- + 3e^- + 2H_2O \longrightarrow MnO_2 + 4OH^-$
	× 2	$C_6H_5-CH_2OH + 5OH^- \longrightarrow C_6H_5-COO^- + 4e^- + 4H_2O$
	0,25	ب- معادلة التفاعل الإجمالي:
01,75		$4MnO_4^- + 3C_6H_5-CH_2OH \longrightarrow 4MnO_2 + 3C_6H_5-COO^- + OH^- + 4H_2O$
		ج- كتابة معادلة تفاعل حمض HCl مع شاردة البنزوات $C_6H_5-COO^-$.
	0,25	

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	
مجموع	مجزأة		
00,50	0,25	$R = \frac{M_p}{M_l} \times 100$	- حساب مردود التفاعل.
	0,25	$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho \times V$ $m = 1,04 \times 3$ $m = 3,12 \text{ g}$	- حساب كتلة الكحول البنزيلي المستعملة:
			- حساب كتلة حمض البنزويك النظرية:
	0,25	$1 \text{ mol } (C_6H_5 - CH_2OH) \rightarrow 1 \text{ mol } (C_6H_5 - COOH)$ $108 \text{ g} \longrightarrow 122 \text{ g}$ $3,12 \longrightarrow m_1$ $m_1 = 3,52 \text{ g}$	
	0,25	$R = \frac{2,80}{3,52} \times 100$ $R = 79,54\%$	
			التمرين الثاني: (07 نقاط)
			1-I إيجاد الصيغة المجملة لـ (TG):
	0,25	$M_{TG} = 12n + 2n - 6 + 96 = 860 \Rightarrow n = \frac{860 - 90}{14} = 55$	
	0,25	$TG: C_nH_{2n-6}O_6 \Rightarrow TG: C_{55}H_{104}O_6$	
			2) أ- إيجاد الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني AG_1 :
02,25	0,25×2	$AG_1: C_nH_{2n}O_2$ $n_{AG_1} = C_{AG_1} \times V_{AG_1} = C_{NaOH} \times V_{NaOH} = 0,5 \times 10 \times 10^{-3} = 0,5 \times 10^{-2} \text{ mol}$	
	0,25	$M_{AG_1} = \frac{m_{AG_1}}{n_{AG_1}} = \frac{1,42}{0,5 \times 10^{-2}} = 284 \text{ g.mol}^{-1}$	
	0,25	$M_{AG_1} = 12n + 2n + 32 \Rightarrow 284 = 14n + 32 \Rightarrow \boxed{n=18}$	
	0,25	$AG_1: CH_3-(CH_2)_{16}-COOH$	
			ب- استنتاج الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني AG_2 :
	0,25	$M_{TG} + 3M_{H_2O} = 2M_{AG_1} + M_{AG_2} + M_{Glycérol}$ $M_{AG_2} = M_{TG} + 3M_{H_2O} - 2M_{AG_1} - M_{Glycérol}$	
	0,25	$M_{AG_2} = 860 + 3 \times 18 - 2 \times 284 - 92 = 254 \text{ g.mol}^{-1}$ $M_{AG_2} = 15 + 14x + 26 + 14x + 28 + 45 = 28x + 114 = 254$	
	0,25	$x = \frac{254 - 114}{28} = 5$	
	0,25	$AG_2: CH_3 - (CH_2)_5 - CH=CH - (CH_2)_7 - COOH$	
			ملاحظة: تقبل الإجابة بإيجاد عدد ذرات الكربون اعتمادا على الصيغة $C_{55}H_{104}O_6$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
00,50	0,25×2	(3) كتابة الصيغ نصف المفصلة الممكنة للثلاثي الغليسيريد TG: $\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-(\text{CH}_2)_{16}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-(\text{CH}_2)_{16}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-(\text{CH}_2)_7-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_5-\text{CH}_3 \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-(\text{CH}_2)_{16}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-(\text{CH}_2)_7-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_5-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-(\text{CH}_2)_{16}-\text{CH}_3 \end{array}$ (4) حساب قرينة التصبن $I_{s(E)}$ لعينة الزيت:
	0,25	- حساب قرينة التصبن لـ (TG): $I_{s(E)} = \frac{90}{100} \times I_{s(TG)} + \frac{10}{100} \times I_{a(AG_1)}$
01,25	0,25×2	- حساب قرينة الحموضة لـ AG_1: $\left. \begin{array}{l} M_{TG} \longrightarrow 3 \cdot M_{KOH} \cdot 10^3 \\ 1 \text{ g} \longrightarrow I_{s(TG)} \end{array} \right\} \Rightarrow I_{s(TG)} = \frac{3 \cdot M_{KOH} \cdot 10^3}{M_{TG}} = \frac{3 \times 56 \times 10^3}{860}$ $\boxed{I_{s(TG)} = 195,35}$
	0,25	- حساب قرينة الحموضة لـ AG_1: $\left. \begin{array}{l} M_{AG_1} \longrightarrow M_{KOH} \cdot 10^3 \\ 1 \text{ g} \longrightarrow I_{a(AG_1)} \end{array} \right\} \Rightarrow I_{a(AG_1)} = \frac{M_{KOH} \cdot 10^3}{M_{AG_1}} = \frac{56 \times 10^3}{284}$ $\boxed{I_{a(AG_1)} = 197,18}$
	0,25	- قرينة التصبن $I_{s(E)}$ للعينة: $I_s = 195,35 \times \frac{90}{100} + 197,18 \times \frac{10}{100} = \boxed{195,53}$
01,25	0,25×3	(I-II) أ- الصيغ الأيونية X, Y, Z لحمض الغلوتاميك: $\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}-\text{COO}^-$ $$ $(\text{CH}_2)_2$ $$ COOH (X) $\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}-\text{COO}^-$ $$ $(\text{CH}_2)_2$ $$ COO^- (Y) $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\text{COO}^-$ $$ $(\text{CH}_2)_2$ $$ COO^- (Z) ب- حساب قيمة pHi لحمض الغلوتاميك: $\text{pHi} = \frac{\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{aR}}{2} = \frac{2,19 + 4,25}{2} = \boxed{3,22}$
	0,25	ج- إيجاد قيمة pH_E: $\text{pH}_E = \frac{\text{pK}_{aR} + \text{pK}_{a2}}{2} = \frac{4,25 + 9,67}{2} = \boxed{6,96}$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)					
مجموع	مجزأة						
00,50	0,25×2	(2) كتابة الصيغتين الأيونيتين الموجودتين في المجال: $pH_E < pH < pK_{a2}$ $\begin{array}{c} H_3N^+ - CH - COO^- \\ \\ (CH_2)_2 \\ \\ COO^- \end{array}$ $\begin{array}{c} H_2N - CH - COO^- \\ \\ (CH_2)_2 \\ \\ COO^- \end{array}$					
00,25	0,25	(3) الصيغة الأيونية السائدة في المجال $pK_{a1} < pH < pK_{a2}$ $\begin{array}{c} H_3N^+ - CH - COO^- \\ \\ (CH_2)_2 \\ \\ COOH \end{array}$					
00,50	0,50	(4) تحديد مواقع الأحماض الأمينية على شريط الهجرة الكهربائية: pH=6 <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 10%;">-</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Arg</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Ala</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Glu</td> <td style="width: 10%;">+</td> </tr> </table>	-	Arg	Ala	Glu	+
-	Arg	Ala	Glu	+			
التمرين الثالث: (06 نقاط)							
I-1 حساب السعة الحرارية للمسعر:							
01,25	0,25	$\sum Q_i = 0 \Rightarrow Q_{Cal} + Q_1 + Q_2 = 0$					
	0,25	$Q_{Cal} = C_{Cal}(T_{f_1} - T_1) = C_{Cal}(315,7 - 297) = 18,7C_{Cal}$					
	0,25	$Q_1 = m_1 \cdot c_e(T_{f_1} - T_1) = 150 \times 4,185(315,7 - 297) \quad \boxed{Q_1 = 11738,92 \text{ J}}$					
	0,25	$Q_2 = m_2 \cdot c_e(T_{f_1} - T_2) = 100 \times 4,185(315,7 - 353) \quad \boxed{Q_2 = -15610,05 \text{ J}}$					
	0,25	$18,7C_{Cal} + 11738,92 - 15610,05 = 0$					
	0,25	$C_{Cal} = \frac{15610,05 - 11738,92}{18,7} \quad \boxed{C_{Cal} = 207 \text{ J.K}^{-1}}$					
(2) أ- الحرارة الكتلية للمعدن (Me).							
01,25	0,25	$\sum Q_i = 0 \Rightarrow Q_{Cal} + Q_3 + Q_4 = 0$					
	0,25	$Q_{Cal} = C_{Cal}(T_{f_2} - T_3) = 207(304,6 - 297) \quad \boxed{Q_{Cal} = 1573,2 \text{ J}}$					
	0,25	$Q_3 = m_3 \times c_e(T_{f_2} - T_3) = 200 \times 4,185(304,6 - 297) \quad \boxed{Q_3 = 6361,2 \text{ J}}$					
	0,25	$Q_4 = m_4 \times c_{(Me)}(T_{f_2} - T_4) = 140 \times c_{(Me)}(304,6 - 369) = -9016 c_{(Me)}$ $1573,2 + 6361,2 - 9016 \times c_{(Me)} = 0$					
	0,25	$c_{(Me)} = \frac{7934,4}{9016} \quad \boxed{c_{(Me)} = 0,88 \text{ J.g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}}$					
0,25	ب- نوع المعدن: $c_{(Me)} = c_{(Al)} = 0,88 \text{ J.g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ومنه المعدن (Me) هو الألمنيوم (Al).						


العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	
مجموع	مجزأة		
00,50	0,25	(1-11) إيجاد عدد مولات كل من غاز البوتان وغاز البروبان في القارورة:	
	0,25	$n_1 = \frac{m_1}{M_{1(C_4H_{10})}} = \frac{11000}{58} = \boxed{189,65 \text{ mol}}$	
01,00	0,25	$n_2 = \frac{m_2}{M_{2(C_3H_8)}} = \frac{2000}{44} = \boxed{45,45 \text{ mol}}$	
	0,25	(2) أ- موازنة المعادلة:	
	0,25	$C_3H_{8(g)} + 5O_{2(g)} \longrightarrow 3CO_{2(g)} + 4H_2O_{(l)}$	
	0,50	ب- حساب انطالبي احتراق البروبان عند 25°C:	
00,50	0,25	$\Delta H_{Comb}^{\circ}(C_3H_{8(g)}) = \sum \Delta H_f^{\circ}(\text{Produits}) - \sum \Delta H_f^{\circ}(\text{Réactifs})$	
	0,25	$\Delta H_{Comb}^{\circ}(C_3H_{8(g)}) = [3\Delta H_f^{\circ}(CO_{2(g)}) + 4\Delta H_f^{\circ}(H_2O_{(l)})] - [\Delta H_f^{\circ}(C_3H_{8(g)}) + 5\Delta H_f^{\circ}(O_{2(g)})]$	
	0,25	$\Delta H_{Comb}^{\circ}(C_3H_{8(g)}) = [3 \times (-393,5) + 4 \times (-286)] - (-104)$	
00,50	0,25	$\boxed{\Delta H_{Comb}^{\circ}(C_3H_{8(g)}) = -2220,5 \text{ kJ.mol}^{-1}}$	
	0,25	(3) إيجاد كمية الحرارة الناتجة عن الاحتراق التام لمحتوى قارورة الغاز:	
	0,25	$Q = Q_1 + Q_2$	
	0,25	$Q = n_1 \Delta H_{Comb}^{\circ}(C_4H_{10(g)}) + n_2 \Delta H_{Comb}^{\circ}(C_3H_{8(g)})$	
01,50	0,25	$Q = [189,65 \times (-2878)] + [45,45 \times (-2220,5)]$	
	0,25	$\boxed{Q = -646734,43 \text{ kJ}}$	
	0,125	(4) حساب انطالبي تشكل البوتان عند 25°C من خلال طاقات الروابط:	
01,50	0,125	$4C_{(s)} + 5H_{2(g)} \xrightarrow{\Delta H_f^{\circ}(C_4H_{10(g)})} C_4H_{10(g)}$	
	0,125	$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ 4\Delta H_{Sub(C)} & & 5E_{(H-H)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ 4C_{(g)} + 10H_{(g)} & \nearrow & C_4H_{10(g)} \end{array}$	
	0,125	$\begin{array}{l} -10E_{(C-H)} \\ -3E_{(C-C)} \end{array}$	
	0,25	$\Delta H_f^{\circ}(C_4H_{10(g)}) = 4\Delta H_{Sub}(C_{(s)}) + 5E_{(H-H)} - 10E_{(C-H)} - 3E_{(C-C)}$	
01,50	0,25	$\Delta H_f^{\circ}(C_4H_{10(g)}) = 4(717) + 5(436) - 10(413) - 3(348)$	
	0,25	$\Delta H_f^{\circ}(C_4H_{10(g)}) = \boxed{-126 \text{ kJ.mol}^{-1}}$	

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
01,00		التمرين الأول (07 نقاط):
	0,25×2	1 أ- إيجاد الصيغة المجملة للمركب A: $A: C_n H_{2n+2} O$ $d_{(A)} = \frac{M_{(A)}}{29} \Rightarrow M_{(A)} = 29 \cdot d_{(A)} \quad M_{(A)} = 29 \times 1,587 = 46 \text{ g.mol}^{-1}$ $14n+18 = 46 \Rightarrow n = \frac{46-18}{14} = 2$ $A: C_2 H_6 O$
	0,25	ب- الصيغ نصف المفصلة للمركب A: $H_3C-CH_2-OH \quad H_3C-O-CH_3$
03,50	0,125×2	2 الصيغ نصف المفصلة للمركبات A , B , C , D , E , F , G: $H_3C-CH_2-OH \quad H_3C-C(=O)-OH \quad H_3C-C(=O)-Cl \quad C_6H_5-C(=O)-CH_3$ (A) (B) (C) (D)
	0,50×7	(E) (F) (G) $C_6H_5-CH_2-CH_3 \quad C_6H_5-COOH \quad O_2N-C_6H_3(COOH)$
	0,50	3 أ- معادلة تفاعل بلمرة المركب (M): $n \text{ molecules of } H_2N-C_6H_3(COOH) \rightarrow [NH-C_6H_3-C(=O)]_n + m H_2O$
01,50	0,25	ب- نوع البلمرة: بلمرة بالتكاثف
	0,25	ج- كتابة مقطع من بوليمير يحتوي على ثلاث وحدات: $—NH-C_6H_3-C(=O)-NH-C_6H_3-C(=O)-NH-C_6H_3-C(=O)—$
	0,25	د- حساب درجة البلمرة: $n = \frac{M_{\text{Polymère}}}{M_{\text{motif}}} \quad M_{\text{motif}} = 7 \times 12 + 5 \times 1 + 16 + 14 = 119 \text{ g.mol}^{-1}$ $n = \frac{240975}{119} = \boxed{2025}$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
01,00	0,25×3	4) أ- إيجاد الصيغ نصف المفصلة للمركبات I ، J ، K :
	0,25	$\begin{array}{ccc} \text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3 & \text{H}_3\text{C}-\overset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{CH}_3 & \text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CH}}}-\text{CH}_3 \\ \text{(I)} & \text{(J)} & \text{(K)} \end{array}$
		ب- استنتاج مردود التفاعل (3): الكحول J ثانوي ومنه مردود التفاعل R=60%.
		التمرين الثاني (07 نقاط):
02,00	0,25×2	1-1) أ- حساب الكتلة المولية لأحادي الغليسريد (MG):
		$\left. \begin{array}{l} M_{\text{MG}} \longrightarrow 1.M_{\text{I}_2} \\ 100 \text{ g} \longrightarrow I_{\text{i(MG)}} \end{array} \right\} \Rightarrow M_{\text{MG}} = \frac{1.M_{\text{I}_2}.100}{I_{\text{i(MG)}}} = \frac{254 \times 100}{71,34}$
		$M_{\text{MG}} = 356 \text{ g.mol}^{-1}$
	0,25	ب- إيجاد الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني (A) :
	0,25	$M_{(\text{MG})} + M_{(\text{H}_2\text{O})} = M_{(\text{A})} + M_{(\text{glycerol})}$
	0,25	$M_{(\text{A})} = M_{(\text{MG})} + M_{(\text{H}_2\text{O})} - M_{(\text{glycerol})} = 356 + 18 - 92$
		$M_{(\text{A})} = 282 \text{ g.mol}^{-1}$
	0,25	صيغة الحمض الدهني (A) من الشكل: (A): $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}\text{O}_2$
	0,25	$14n + 30 = 282 \Rightarrow n = \frac{282 - 30}{14} = 18 \quad (\text{A}): \text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$
	0,25	(A): $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_7-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_7-\text{COOH}$
		ج- حساب قرينة اليود $I_{\text{i(A)}}$ وقرينة الحموضة $I_{\text{a(A)}}$:
	0,25	$\left. \begin{array}{l} M_{(\text{A})} \longrightarrow 1.M_{\text{I}_2} \\ 100 \text{ g} \longrightarrow I_{\text{i(A)}} \end{array} \right\} \Rightarrow I_{\text{i(A)}} = \frac{1.M_{\text{I}_2}.100}{M_{(\text{A})}} = \frac{254 \times 100}{282}$
		$I_{\text{i(A)}} = 90$
	0,25	$\left. \begin{array}{l} M_{(\text{A})} \longrightarrow 1.M_{\text{KOH}} \times 10^3 \\ 1 \text{ g} \longrightarrow I_{\text{a(A)}} \end{array} \right\} \Rightarrow I_{\text{a(A)}} = \frac{1.M_{\text{KOH}} \times 10^3}{M_{(\text{A})}} = \frac{56 \times 10^3}{282}$
		$I_{\text{a(A)}} = 198,58$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
02,25		2) أ- إيجاد النسبتين المئويتين $X_{(A)}\%$ و $Y_{(A)}\%$
	0,25	$I_{i(E)} = \frac{30}{100} \times I_{i(MG)} + \frac{X_{(A)}}{100} \times I_{i(A)}$ $100 \times I_{i(E)} = 30 \times I_{i(MG)} + X_{(A)} \times I_{i(A)}$ $X_{(A)} = \frac{100 \times I_{i(E)} - 30 \times I_{i(MG)}}{I_{i(A)}} = \frac{100 \times 43,92 - 30 \times 71,34}{90} = 25$
	0,25	$X_{(A)}\% = 25\%$
		$30 + 35 + X + Y = 100 \Rightarrow Y = 100 - (30 + 35 + X)$ $Y = 100 - (65 + 25) = 10$
	0,25	$Y\% = 10\%$
		ب- حساب قرينة الحموضة $I_{a(B)}$
	0,25	$I_{a(E)} = \frac{25}{100} \times I_{a(A)} + \frac{10}{100} \times I_{a(B)}$ $I_{a(B)} = \frac{100 \times I_{a(E)} - 25 \times I_{a(A)}}{10} = \frac{100 \times 71,52 - 25 \times 198,58}{10}$
	0,25	$I_{a(B)} = 218,75$
		ج- إيجاد الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني B:
	0,25	$\left. \begin{array}{l} M_{(B)} \longrightarrow 1.M_{KOH} \times 10^3 \\ 1 \text{ g} \longrightarrow I_{a(B)} \end{array} \right\} \Rightarrow M_{(B)} = \frac{1.M_{KOH} \times 10^3}{I_{a(B)}} = \frac{56 \times 10^3}{218,75}$
	0,25	$M_{(B)} = 256 \text{ g.mol}^{-1}$
		$B : C_n H_{2n} O_2 \Rightarrow 14n + 32 = 256 \Rightarrow n = 16$
	0,25	$B : C_{16} H_{32} O_2 \Rightarrow CH_3 - (CH_2)_{14} - COOH$
		د- الصيغ نصف المفصلة الممكنة لثنائي الغليسريد DG:
	0,25×2	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_2 - \text{O} - \text{C} - (\text{CH}_2)_{14} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH} - \text{O} - \text{C} - (\text{CH}_2)_{14} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{OH} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_2 - \text{O} - \text{C} - (\text{CH}_2)_{14} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH} - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_2 - \text{O} - \text{C} - (\text{CH}_2)_{14} - \text{CH}_3 \\ \parallel \\ \text{O} \end{array}$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
01,00	0,25×4	II-1) ايجاد الأحماض الأمينية: A , B , C , D B هو البرولين (Pro): لأنه يعطي لونا أصفرا عندما يتفاعل مع كاشف النينهيدرين. C هو الليزين (Lys): لأنه يتفاعل مع مولين من حمض النيتروز HNO_2 لاحتوائه على مجموعتين $(-\text{NH}_2)$. D هو التيروسين (Tyr): لأنه أروماتي فيعطي نتيجة إيجابية مع كاشف كزانثوبروتيك. وببقى A هو الإيزولوسين (Ile). (2) الصيغة الأيونية لرباعي الببتيد عند $\text{pH}=1$:
00,25	0,25	
00,75	0,25×3	(3) كتابة الصيغ الأيونية للحمض الأميني (Ile) عند تغير الـ pH من 1 إلى 13 $\text{pKa}_1 = 2,36$ pH_i $\text{pKa}_2 = 9,68$ pH
00,50	0,25×2	(4) الصيغتين الأيونيتين لـ (Ile) المتواجدتين في المجال: $\text{pH}_1 < \text{pH} < \text{pKa}_2$ $\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
00,25	0,25	(5) الصيغة الأيونية لـ (Ile) السائدة عند $\text{pH}=8$ $\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
01,00		التمرين الثالث: (06 نقاط)
		1-1 حساب انطالبي التفاعل ΔH_r° عند 25°C :
	0,50	$\Delta H_r^\circ = \sum \Delta H_f^\circ (\text{Produits}) - \sum \Delta H_f^\circ (\text{Réactifs})$ $\Delta H_r^\circ = [\Delta H_f^\circ (\text{C}_4\text{H}_{10}(\text{g})) + \Delta H_f^\circ (\text{H}_2\text{S}(\text{g}))] - [\Delta H_f^\circ (\text{C}_4\text{H}_4\text{S}(\text{c})) + 4\Delta H_f^\circ (\text{H}_2(\text{g}))]$ $\Delta H_r^\circ = -126 + (-20,6) - (80,2)$
	0,50	$\Delta H_r^\circ = -226,8 \text{ kJ.mol}^{-1}$
00,75		2) إيجاد التغير في الطاقة الداخلية ΔU للتفاعل السابق عند درجة حرارة 25°C :
	0,25	$\Delta H_r^\circ = \Delta U + \Delta n_{(\text{g})} \cdot R \cdot T \Rightarrow \Delta U = \Delta H_r^\circ - \Delta n_{(\text{g})} \cdot R \cdot T$
	0,25	$\Delta n_{(\text{g})} = 1 + 1 - 4 = -2 \text{ mol}$
	0,25	$\Delta U = -226,8 - (-2) \times 8,314 \times 298 \times 10^{-3}$ $\Delta U = -221,84 \text{ kJ.mol}^{-1}$
02,00		3) حساب انطالبي التفاعل السابق ΔH_r عند درجة حرارة 90°C :
		
		باستعمال علاقة كيرشوف:
	0,50	$\Delta H_{363} = \Delta H_{298} + \int_{298}^{357} \Delta C_p dT - \Delta H_{\text{vap}}^\circ (\text{C}_4\text{H}_4\text{S}) + \int_{357}^{363} \Delta C_p dT$ $\Delta H_{363} = \Delta H_{298} + \Delta C_p (357 - 298) - \Delta H_{\text{vap}}^\circ (\text{C}_4\text{H}_4\text{S}) + \Delta C_p (363 - 357)$
		$\Delta C_p = \sum C_p (\text{Produits}) - \sum C_p (\text{réactifs})$
	0,375	$\Delta C_p = C_p (\text{C}_4\text{H}_{10}(\text{g})) + C_p (\text{H}_2\text{S}(\text{g})) - C_p (\text{C}_4\text{H}_4\text{S}(\text{c})) - 4C_p (\text{H}_2(\text{g}))$ $\Delta C_p = 98,5 + 34,2 - 123,8 - (4 \times 28,8)$
	0,25	$\Delta C_p = -106,3 \text{ J.mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
	0,375	$\Delta C_p = C_p (\text{H}_2\text{S}(\text{g})) + C_p (\text{C}_4\text{H}_{10}(\text{g})) - C_p (\text{C}_4\text{H}_4\text{S}(\text{c})) - 4C_p (\text{H}_2(\text{g}))$ $\Delta C_p = 98,5 + 34,2 - 72,8 - (4 \times 28,8)$
	0,25	$\Delta C_p = -55,3 \text{ J.mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
	0,25	$\Delta H_{363} = -226,8 + (-106,3) \times 10^{-3} \times (357 - 298) - 34,7 + (-55,3) \times 10^{-3} \times (363 - 357)$ $\Delta H_{363} = -268,1 \text{ kJ.mol}^{-1}$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
01,50	0,25×4	(4) أ- إكمال المخطط: $ \begin{array}{ccc} S_{(s)} & + & O_{2(g)} \xrightarrow{\Delta H_f^\circ(SO_{2(g)})} O=S=O_{(g)} \\ \downarrow \Delta H_{sub}^\circ(S_{(s)}) & & \downarrow E_{(O=O)} \\ S_{(g)} & + & 2O_{(g)} \xrightarrow{-2E_{(S=O)}} O=S=O_{(g)} \end{array} $
	0,25	ب- حساب طاقة الرابطة $E_{(S=O)}$: $\Delta H_f(SO_{2(g)}) = \Delta H_{sub}^\circ(S_{(s)}) + E_{(O=O)} - 2E_{(S=O)}$ $E_{(S=O)} = \frac{\Delta H_{sub}^\circ(S_{(s)}) + E_{(O=O)} - \Delta H_f(SO_{2(g)})}{2}$ $E_{(S=O)} = \frac{568 + 498 - (-296,8)}{2}$ $E_{(S=O)} = 681,4 \text{ kJ.mol}^{-1}$
	0,25	II-1) حساب السرعة المتوسطة V_{moy} لتفكك $C_6H_5N_2Cl$ $V_{moy} = -\frac{\Delta[C_6H_5N_2Cl]}{\Delta t} = -\frac{0,017 - 0,032}{20 - 5}$ $V_{moy} = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$
00,50	0,25	(2) إيجاد السرعة اللحظية V_i لتفكك $C_6H_5N_2Cl$ عند $t = 10 \text{ min}$ التفاعل من الرتبة الأولى: $V_i = K[C_6H_5N_2Cl]^1 = K[C_6H_5N_2Cl]$ $V_i = 0,042 \times 0,026 = 1,09 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$ ملاحظة: تقبل الإجابة حالة رسم المنحنى $[C_6H_5N_2Cl] = f(t)$ وحساب ميل المماس.
	0,125	(3) حساب زمن نصف التفاعل $t_{\frac{1}{2}}$: التفاعل من الرتبة الأولى: $t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{K} = \frac{\ln 2}{0,042} = \frac{0,693}{0,042} = 16,5 \text{ min}$
0,125	0,125	