



الإجابة النموذجية

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	
مجموع	مجزأة		
0.75	3x0.25	التمرين الأول : (10 نقاط) 1 - أ تعريف ماتمثلة الحروف : A : عدد قواعد الرامزة ، B : عدد أنواع القواعد الأزوتية ، C : عدد أنواع الرامزات	
0.75	3x0.25	التسمية : اللغة 1 : لغة نووية ، اللغة 2 : لغة بروتينية ، القاموس : جدول الشفرة الوراثية	ب
1	1	حساب عدد كلمات اللغة : باعتبار A تساوي 3 و B تساوي 2 $2^3=8$ ملاحظة : ضرورة تطبيق العلاقة	ج
1	4x0.25	الإشارات : إشارات البدء : AUG التي تمثل الحمض الأميني MET إشارات النهاية : UGA ، UAG ، UAA	د
3.5	6x0.25 4x0.25 4x0.25	أسماء السانات المرقمة : 1 - رامزة إنطلاق ، 2 - الموقع P ، 3 - حمض أميني 4 - ريبوزوم (تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم) ، 5 - الموقع A ، 6 - ARNt أسماء الأحماض الأمية : Met : A1 ، Lys : A2 ، Phe : A3 ، Gly : A5 ثلاثة القواعد الأزوتية : AAG : س ، ACC : ص ، UGG : ع ، GGC : ل	2- أ
1.5	1.5	الصيغة الكيميائية للجزء المؤطر (م) : $\begin{array}{ccccccc} & & \text{O} & & \text{R}_2 & & \text{H} & & \text{O} \\ & & & & & & & & \\ \text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\text{C}-\text{N}-\text{CH}-\text{C}-\text{N}-\text{CH}-\text{C} & \dots\dots & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ \text{R}_1 & & \text{H} & & \text{O} & & \text{R}_3 & & \end{array}$	ب
1.5	2x0.25 3x0.25 0.25	وصف الأحداث التي سمحت بالانتقال من الشكل أ إلى الشكل ب : - إنقطاع الترابط بين الـ ARNt الثالث الحامل لثلاثي الببتيد و حمضه الأميني و تشكل رابطة ببتيدية بين الحمض الأميني الثالث و الرابع . - حركة الريبوزوم برامزة واحدة ، فيصبح الـ ARNt الرابع الحامل لرباعي الببتيد في الموقع P و يصبح الموقع A شاغرا - يأتي ARNt خامس حامل لحمض أميني خامس و يتوضع في الموقع A للريبوزوم	ج

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	
مجموع	مجزأة		
1.5	0.5 1	التمرين الثاني : (10 نقاط) 1 - أ - تسمية العنصر (س) : قوس ترسب - يمثل ارتباط الأجسام المضادة بالبروتين مصّل دم البقر (مستضدات منحلة) مشكلة معقدات مناعية	
1.5	الرسم 0.5 البيانات 1	ب - رسم معقد مناعي : ملاحظة : تقبل الأشكال الأخرى للمعقد المناعي : 	
0.75	0.75	ج - المعلومة المستخلصة : الأجسام المضادة عملها نوعي ، ترتبط بالمستضد الذي حرض على إنتاجها حيث تتكامل معه بنيويا	
0.75	3x0.25	2- أ التعليل : - تأثير الأشعة X : تخريب النخاع العظمي و بالتالي عدم إنتاج الخلايا للمفاوية - تأثير إستئصال الغدة السعترية : عدم نضج الخلايا للمفاوية LT - أخذ خلايا لمفاوية من فئران نفس السلالة للتوفيق النسيجي لنظام CMH	
2	4x0.5	ب تفسير النتائج: - تشكل قوس الترسيب بين الحفرة (م) و (د) لأن مصّل المجموعة الرابعة يحتوي على أجسام مضادة ضد ألبومين البقر لأن هذه الفئران حقنت بنوعى الخلايا للمفاوية B و T حيث تنشط الخلايا للمفاوية B المنتقاة التي تتكاثر و تتميز إلى خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة - عدم تشكل قوس الترسيب ما بين الحفرة (م) و باقي الحفر (أ ، ب ، ج) لغياب الأجسام المضادة ضد المستضد وذلك للأسباب التالية : - المجموعة الأولى الشاهدة : عدم حدوث إستجابة مناعية عند حقن مجموعة الفئران بألبومين مصّل البقر لغياب الخلايا للمفاوية B و T - المجموعة الثانية : لم تحدث كذلك إستجابة مناعية رغم حقنها بلمفاويات T وذلك لغياب الخلايا للمفاوية B المسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة - المجموعة الثالثة : رغم حقنها باللمفاويات B لم تنتج أجسام مضادة لغياب الخلايا للمفاوية LT4 التي تنشط الخلايا للمفاوية بواسطة المواد الكيميائية .	

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	
مجموع	مجزأة		
0.5	0.5	3-أ - نوع الاستجابة المناعية المدروسة : مناعة نوعية ذات وساطة خلوية	
3	1.5	الرسم التخطيطي : التعرف المستضد التعرف المزدوج بواسطة المستقبل TCR التنشيط + الإنترلوكين HLA II BCR التكاثر التمايز التمايز LT4m LTh LBm بلازمية أجسام مضادة التخلص من المعقد المناعي معقد مناعي الانتقاء التسلبي التضخيم : التكاثر و التمايز التنفيذ	
	1		
	0.5		

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	
مجموع	مجزأة		
1.5	2x0.25	التمرين الأول : (10 نقاط) تسمية الخليتين : خلية الشكل (أ) : خلية لمفاوية LB ، خلية الشكل (ب) : خلية بلازمية LBP	I
	1	أسماء البيانات المرقمة : 1 - غشاء هيولى ، 2 - حويصلة إفرازية ، 3 - جهاز كولجى 4- شبكة هيولية ، 5 - هيولى ، 6 - نواة ، 7 - ميتوكوندري	1- أ
1	2x0.5	مصدر الخليتين : - مصدر الخلية LB (الشكل أ) : نقي العظام (عضو لمفاوي مركزي) - مصدر الخلية البلازمية (الشكل ب) : تمايز الخلية للمفاوية LB المنتقة	2
0.5	2x0.25	المقارنة : نتائج الفصل أ : تظهر أربع مواقع متواجدة على مستويات مختلفة : 1 ، 2 ، 3 تمثل ARNr و الموقع 4 يمثل ARNt نتائج الفصل ب : تماثل المواقع 1 ، 2 ، 3 ، 4 مع ظهور الموقع 5 الذي يمثل ARNm	3 - أ
1.25	0.25 1	العلاقة بين النتائج المحصل عليها و بنية الخليتين : غياب الموقع 5 فى نتائج الفصل (أ) : دلالة على أن الخلية للمفاوية خارج فترة تركيب البروتين (مرحلة ما قبل الإنتقاء) ظهور الموقع 5 فى نتائج الفصل (ب) : دلالة على أن الخلية البلازمية فى حالة تركيب البروتين على مستوى الشبكة الهيولية التى تظهر غزيرة تم تخزينه فى جهاز غولجى الذي يظهر كثيفا ثم إفراز البروتين بواسطة الحويصلات التى تظهر بعدد كبير اما الميتوكوندري فتظهر نامية و بعدد أكبر لتوفير الطاقة .	ب
1	2x0.5	تسمية الحزينة : جسم مضاد طبيعتها الكيميائية : بروتين (غاما غلوبولين)	II 1
0.25	0.25	الجزء المؤطر : ثلاثى الببتيد	2 - أ
1	1	الصيغة الكيميائية : $\cdots\cdots\text{HN}-\underset{\text{R1}}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{ }}{\text{C}}}-\underset{\text{H}}{\text{N}}-\overset{\text{R2}}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{ }}{\text{C}}}-\underset{\text{O}}{\text{N}}-\underset{\text{R3}}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{ }}{\text{C}}}-\text{OH}$	ب

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	
مجموع	مجزأة		
1	1	تابع التمرين الأول :	
		3 - أ - كيفية الحفاظ على البنية الفراغية الوظيفية : بواسطة الروابط التي نشأت ما بين جذور الأحماض الأمينية خلال التطور الثلاثي الأبعاد للسلسلة البروتينية وهي : - روابط هيدروجينية ، روابط شاردية ، جسور ثنائية الكبريت ، تجاذب الجذور الكارهة للماء	
2.5	1	ب - توضيح العلاقة بين بنية الحزينة و تخصصها الوظيفي : إن البنية الفراغية التي إكتسبتها هذه الحزينة سمحت بنشوء مواقع ذات تخصص وظيفي ، أهمها موقعي تثبيت المستضد بصورة نوعية نتيجة التكامل البنيوي .	
	الرسم 0.5	- الرسم التخطيطي : 	
	البيانات 1		

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	
مجموع	مجزأة		
1	2x0.5	التمرين الثاني : (10 نقاط) I- 1 - اسم الخلية (س) : LTC ، مصدرها : تمايز LT8 المنتقة	
1.5	3x0.5	2 - شروط عمل الخلية س (LTC) : - أن تكون الخلية مصابة - الخلية المصابة تحمل على سطح غشائها نفس الببتيد المستضدي الذي حرض على إنتاج LTC - أن تكون الخلية المصابة لنفس سلالة الفأر (توافق نسيجي لنظام CMH)	
1	4x0.25	وصف آلية عمل الخلية للمقاومة LTC : - الخلية تتعرف على الخلية المصابة نتيجة تماس الغشائين ، حيث يتكامل المستقبل الغشائي TCR مع معقد ببتيد مستضدي - بروتين CMH I المتواجد على سطح غشاء الخلية المصابة (التعرف المزدوج) - نتيجة التعرف المزدوج تفرز LTC جزيئات البرفورين مع بعض الإنزيمات الحالة في منطقة التماس حيث تتغير البنية الفراغية لجزيئات البرفورين ثم تخترق غشاء الخلية المصابة مشكلة قنوات يمر عبرها الماء و الأملاح محدثة صدمة حلولية .	ب
0.75	0.75	II - التحليل : يمثل المنحنى البياني تغير كمية الأنتروكين بدلالة الزمن قبل الإصابة و بعد الإصابة . - من الزمن 0 إلى الأسبوع الأول : بقيت كمية الأنتروكين منخفضة (تكاد تنعدم) و ثابتة وذلك قبل وبعد الإصابة - من الأسبوع 1 إلى الأسبوع 3 : ترايد تدريجي لكمية الأنتروكين مع مرور الزمن	أ - 1
1.5	0.5 1	ب - التعليل : • ما بين زمن الإصابة و الأسبوع الأول : بقيت كمية الأنتروكين منخفضة و ثابتة لأنها تمثل الفترة الزمنية اللازمة للإنتقاء • ما بين الأسبوع الثاني و الثالث : الخلايا للمقاومة LT4 المنتقة في وجود ببتيد مستضدي معروض على سطح غشاء الخلية العارضة (البالعة الكبيرة) بواسطة بروتين CMH II تفرز الأنتروكين الذي يحفزها على التكاثر ثم تتمايز إلى LTh الخلايا للمقاومة LTh تفرز الأنتروكين بكثافة لغرض تنشيط الاستجابة المناعية لذلك سجلنا ارتفاع كمية الأنتروكينات في الدم	ب

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	
مجموع	مجزأة		
0.75	0.75	تابع التمرين الثاني	2 - أ
0.75	0.75	التوضيح : - الأثرلوكينات المفرزة تنشط و تحفز LT8 على التكاثر و التمايز إلى LTC	
1	1	التعليل : - يستهدف فيروس فقدان المناعة البشري (VIH) خلايا معينة في جسم الإنسان ، مثل الخلايا للمقاومة LT4 المساعدة ، محدثا مع مرور السنوات نقص في عددها . بما أن دور الخلايا للمقاومة LT4 المساعدة خلال الإستجابة المناعية ، إنتاج الأثرلوكينات فنقص عددها يؤدي إلى نقص كمية الأثرلوكين في الدم .	ب
0.25	0.25	نوع الإستجابة المناعية : مناعة نوعية ذات وساطة خلوية	III
1	1	الرسم التخطيطي : الإنشاء النسيلي النتيجة : التكاثر و التمايز LT4_m LT_{Th} LTC التفصيل خلية مصابة إحلال الخلية المصابة	
2.5	0.75		
0.5	0.5		